

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
№ _____
Реєстраційне посвідчення
№ _____

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ІНФЛЮЦИД
(INFLUCID®)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: прозора, світло-жовта рідина, іноді з зеленим відтінком, зі запахом алкоголю, слабким пряним, ледь солодкуватим;

склад: 100 г розчину містять Aconitum D3 10 г, Gelsemium D3 10 г, Ipecacuanha D3 10 г, Phosphorus D5 10 г, Bryonia D2 10 г, Eupatorium perfoliatum D1 10 г;

допоміжні речовини: етанол 96 %, вода очищена.

Форма випуску. Розчин для перорального застосування.

Фармакотерапевтична група. Гомеопатичний лікарський засіб.

Фармакологічні властивості. Препарат містить шість активних компонентів найбільш прийнятних для лікування гострих застудних захворювань верхніх дихальних шляхів і грипу. Засіб швидко купірує типові ознаки гострої інфекції дихальних шляхів, такі як гарячка, головний біль, болючість м'язів, а також риніт, фарингіт. Препарат посилює природний захист організму і сприяє швидкому видужанню і відновленню сил після перенесеного захворювання, у такий спосіб скорочує або запобігає ознакам виснаження (астенічний синдром). Застосування препарату при перших проявах захворювання або відразу після контакту з захворілими людьми сприяє запобіганню розвитку захворювання.

Показання для застосування. Профілактика і лікування грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій.

Спосіб застосування та дози.

При гострому захворюванні застосовувати по 10 крапель розчину щогодини (не більше 12 разів на день) до покращання стану. При подальшому лікуванні - по 10 крапель розчину 3 рази на день до повного одужання.

Тривалість лікування: 7-10 днів (до повного зникнення симптоматики).

Для профілактики респіраторно-вірусної інфекції рекомендується приймати по 10 крапель розчину 3 рази на день.

Тривалість застосування після контакту з хворими на респіраторну інфекцію або грип - 1 тиждень.

Розчин приймають за півгодини до їди або через півгодини після їди, потримавши його деякий час у роті перед тим як проковтнути. Дітям віком від 12 років препарат можна розчиняти у невеликій кількості води (наприклад, у чайній ложці).

Побічна дія. В поодиноких випадках можливі реакції гіперчутливості: висипи на шкірі або шлунково-кишкові розлади, такі як нудота, блювання або діарея.

Протипоказання. Через вміст спирту Інфлюцид не можна призначати хворим з алкогольною залежністю.

Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату.

Передозування. Шкідливі впливи передозування дотепер не відомі.

Особливості застосування. При застосуванні гомеопатичних лікарських засобів можливе тимчасове первинне погіршення симптомів захворювання. У цьому випадку слід знизити частоту і дозування препарату і, після регресії небажаних симптомів, відновити прийом препарату відповідно до інструкції. У разі вираженого первинного погіршення, що супроводжується поганою переносимістю препарату, слід припинити його застосування.

У препараті Інфлюцид міститься 46 % спирт (*об'ємна частка компонента*). Тому існує підвищений ризик для здоров'я пацієнтів, які страждають на захворювання печінки і хворих на алкоголізм, а також вагітних і дітей віком до 12 років.

Для дітей віком від 1 до 12 років рекомендується застосовувати препарат Інфлюцид таблетки.

При збереженні високої температури тіла або при її підвищенні понад 39 °С, при збереженні або нез'ясованості симптоматики, а також із появою нових симптомів слід змінити тактику лікування.

Відповідно до загальноприйнятих принципів, застосовувати препарат у період вагітності й годування груддю можна лише після об'єктивної оцінки співвідношення очікуваного корисного ефекту і можливого ризику.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Дотепер не відома.

Умови та термін зберігання. Зберігати при кімнатній температурі (15 - 25 °С) у недоступному для дітей місці.

Термін придатності - 5 років.

Не застосовувати після зазначеної на упаковці дати закінчення терміну придатності.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 30 мл розчину у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці.

Виробник. Дойче Хомеопаті-Уніон ДХУ-Арцнайміттель ГмБХ & Ко. КГ.

Адреса. Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруе, Німеччина.

**Перший заступник директора
Державного фармакологічного центру
МОЗ України, д. мед. н., проф.**

А. М. Морозов

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
здравоохранения Украины
№ _____
Регистрационное свидетельство
№ _____

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ИНФЛЮЦИД
(INFLUCID®)

Общая характеристика:

основные физико-химические свойства: прозрачная, светло-желтая жидкость, иногда с зеленым оттенком, с запахом алкоголя, слегка пряным и слегка сладковатым;

состав: 100 г раствора содержат Aconitum D3 10 г, Gelsemium D3 10 г, Ipecacuanha D3 10 г, Phosphorus D5 10 г, Bryonia D2 10 г, Eupatorium perfoliatum D1 10 г;

вспомогательные вещества: этанол 96 %, вода очищенная.

Форма выпуска. Раствор для перорального применения.

Фармакотерапевтическая группа. Гомеопатическое лекарственное средство.

Фармакологические свойства. Препарат содержит шесть активных компонентов, наиболее приемлемых для лечения острых простудных заболеваний верхних дыхательных путей и гриппа. Средство быстро купирует типичные признаки острой инфекции верхних дыхательных путей, такие как лихорадка, головная боль, болезненность мышц, а также ринит, фарингит. Препарат усиливает естественную защиту организма и способствует быстрому выздоровлению и восстановлению сил после перенесенного заболевания, таким образом, сокращает или предотвращает признаки истощения (астенический синдром). Применение препарата при первых проявлениях заболевания или сразу после контакта с заболевшими людьми способствует предотвращению развития заболевания.

Показания к применению. Профилактика и лечение гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

Способ применения и дозы.

При остром заболевании принимать по 10 капель раствора каждый час (не более 12 раз в день) до наступления улучшения, при последующем лечении - по 10 капель раствора 3 раза в день до полного выздоровления.

Длительность лечения: 7-10 дней (до полного исчезновения симптоматики).

Для профилактики респираторно-вирусной инфекции рекомендуется принимать по 10 капель раствора 3 раза в день.

Длительность применения после контакта с людьми с острой респираторной инфекцией или гриппом - 1 неделя.

Раствор принимают за полчаса до еды или через полчаса после еды, подержав его перед проглатыванием некоторое время во рту. Детям старше 12 лет препарат можно растворить в небольшом количестве воды (например, в чайной ложке).

Побочное действие. В редких случаях возможны реакции гиперчувствительности: высыпания на коже или желудочно-кишечные расстройства, такие как тошнота, рвота или диарея.

Противопоказания. Из-за содержания спирта Инфлюцид нельзя назначать больным с алкогольной зависимостью.

Повышенная чувствительность к какому-либо ингредиенту препарата.

Передозировка. Вредные воздействия передозировки доныне не известны.

Особенности применения. При применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное первичное ухудшение симптомов заболевания. В этом случае следует снизить частоту и дозировку применения препарата и, после регрессии нежелательных симптомов, восстановить прием препарата согласно инструкции. В случае выраженного первичного ухудшения, сопровождающегося плохой переносимостью препарата, следует прекратить его применение.

В препарате Инфлюцид содержится 46 % спирт (*объемная доля компонента*). Поэтому существует повышенный риск для здоровья у больных, страдающих заболеваниями печени и алкоголизмом, а также беременных и детей в возрасте до 12 лет.

Для детей в возрасте от 1 до 12 лет рекомендуется применять препарат Инфлюцид таблетки.

При сохранении высокой температуры тела или при ее повышении свыше 39 °С, при сохранении или неясности симптоматики, а также при появлении новых симптомов следует изменить тактику лечения.

В соответствии с общепринятыми принципами применять препарат в период беременности и кормления грудью можно только после объективной оценки соотношения ожидаемого полезного эффекта и возможного риска.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами. Доныне не известны.

Условия и срок хранения. Хранить при комнатной температуре (15 - 25 °С) в недоступном для детей месте.

Срок годности - 5 лет.

Не применять после указанной на упаковке даты истечения срока годности.

Условия отпуска. Без рецепта.

Упаковка. По 30 мл раствора во флаконе; по 1 флакону в картонной коробке.

Производитель. Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ.

Адрес. Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруэ, Германия.

**Первый заместитель директора
Государственного фармакологического
центра МЗ Украины, д. мед. н., проф.**

А. Н. Морозов