

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ Міністерства**  
**охорони здоров'я України**  
№ \_\_\_\_\_  
**Реєстраційне посвідчення**  
№ \_\_\_\_\_

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**  
**ІНФЛЮЦИД**  
**(INFLUCID®)**

**Загальна характеристика:**

**основні фізико-хімічні властивості:** від білого до злегка біло-жовтуватого кольору, іноді злегка плямисті, круглі, двоплощинні таблетки зі скошеною кромкою;

**склад:** 1 таблетка (250 мг) містить Aconitum D3 25 мг, Gelsemium D3 25 мг, Ipsecacuanha D3 25 мг, Phosphorus D5 25 мг, Bryonia D2 25 мг, Eupatorium perfoliatum D1 25 мг;

**допоміжні речовини:** лактози моногідрат, магнію стеарат, крохмаль пшеничний.

**Форма випуску.** Таблетки.

**Фармакотерапевтична група.** Гомеопатичний лікарський засіб.

**Фармакологічні властивості.** Препарат містить шість активних компонентів найбільш прийнятних для лікування гострих застудних захворювань верхніх дихальних шляхів і грипу. Засіб швидко купірує типові ознаки гострої інфекції дихальних шляхів, такі як гарячка, головний біль, болючість м'язів, а також риніт, фарингіт. Препарат посилює природний захист організму і сприяє швидкому видужанню і відновленню сил після перенесеного захворювання, у такий спосіб скорочує або запобігає ознакам виснаження (астенічний синдром). Застосування препарату при перших проявах захворювання або відразу після контакту з захворілими людьми сприяє запобіганню розвитку захворювання.

**Показання для застосування.** Профілактика і лікування грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій.

**Спосіб застосування та дози.** При гострому захворюванні дітям віком від 1 до 12 років застосовувати по одній таблетці кожні 2 год (не більше 8 таблеток на добу) до покращання стану. При подальшому лікуванні - приймати по одній таблетці 3 рази на день.

Дітям віком від 12 років і дорослим при гострому захворюванні приймати по 1 таблетці щогодини (не більше 12 таблеток на добу) до покращання стану, далі - по 1-2 таблетки 3 рази на день.

Тривалість лікування: 7-10 днів (до повного зникнення симптоматики).

*Для профілактики респіраторно-вірусної інфекції* дітям віком від 1 до 12 років рекомендується застосовувати по 1 таблетці 3 рази на день. Дітям віком від 12 років і дорослим приймати по 1-2 таблетки 3 рази на день.

Тривалість застосування після контакту з хворими на респіраторну інфекцію або грип - 1 тиждень.

Таблетки приймають за півгодини до їди або через півгодини після їди, даючи їм повільно розчинитися в роті. Дітям віком до 3-х років рекомендується для зручності застосування розчиняти таблетку у невеликій кількості води (наприклад, у чайній ложці).

**Побічна дія.** В поодиноких випадках можливі реакції гіперчутливості: висипи на шкірі або шлунково-кишкові розлади, такі як нудота, блювання або діарея.

**Протипоказання.** Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату.

**Передозування.** Шкідливі впливи передозування дотепер не відомі.

**Особливості застосування.** При застосуванні гомеопатичних лікарських засобів можливе тимчасове первинне погіршення симптомів захворювання. У цьому випадку слід знизити частоту і дозування препарату і, після регресії небажаних симптомів, відновити прийом препарату відповідно до інструкції. У разі вираженого первинного погіршення, що супроводжується поганою переносимістю препарату, слід припинити його застосування.

Застереження для хворих з непереносимістю лактози або глютенною хворобою: Інфлюцид містить лактозу і пшеничний крохмаль.

При збереженні високої температури тіла або при її підвищенні понад 39 °С, при збереженні або нез'ясованості симптоматики, а також з появою нових симптомів слід змінити тактику лікування.

Відповідно до загальноприйнятих принципів, застосовувати препарат у період вагітності й годування груддю можна лише після об'єктивної оцінки співвідношення очікуваного корисного ефекту і можливого ризику.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами.** Дотепер не відома.

**Умови та термін зберігання.** Зберігати при кімнатній температурі (15 - 25 °С) у недоступному для дітей місці.

Термін придатності - 5 років.

Не застосовувати після зазначеної на упаковці дати закінчення терміну придатності.

**Умови відпуску.** Без рецепта.

**Упаковка.** По 20 таблеток у блістері; по 3 блістери у картонній коробці.

**Виробник.** Дойче Хомеопаті-Уніон ДХУ-Арцнайміттель ГмбХ & Ко. КГ.

**Адреса.** Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруе, Німеччина.

**Перший заступник директора  
Державного фармакологічного центру  
МОЗ України, д. мед. н., проф.**

**А. М. Морозов**

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Приказ Министерства**  
**здравоохранения Украины**  
№ \_\_\_\_\_  
**Регистрационное свидетельство**  
№ \_\_\_\_\_

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по медицинскому применению препарата**  
**ИНФЛЮЦИД**  
**(INFLUCID®)**

**Общая характеристика:**

**основные физико-химические свойства:** от белого до слегка бело-желтоватого цвета, иногда слегка пятнистые, круглые двухплоскостные таблетки со скошенной кромкой;

**состав:** 1 таблетка (250 мг) содержит Aconitum D3 25 мг, Gelsemium D3 25 мг, Ipecacuanha D3 25 мг, Phosphorus D5 25 мг, Bryonia D2 25 мг, Eupatorium perfoliatum D1 25 мг;

**вспомогательные вещества:** лактозы моногидрат, магния стеарат, крахмал пшеничный.

**Форма выпуска.** Таблетки.

**Фармакотерапевтическая группа.** Гомеопатическое лекарственное средство.

**Фармакологические свойства.** Препарат содержит шесть активных компонентов, наиболее приемлемых для лечения острых простудных заболеваний верхних дыхательных путей и гриппа. Средство быстро купирует типичные признаки острой инфекции верхних дыхательных путей, такие как лихорадка, головная боль, болезненность мышц, а также ринит, фарингит. Препарат усиливает естественную защиту организма и способствует быстрому выздоровлению и восстановлению сил после перенесенного заболевания, таким образом, сокращает или предотвращает признаки истощения (астенический синдром). Применение препарата при первых проявлениях заболевания или сразу после контакта с заболевшими людьми способствует предотвращению развития заболевания.

**Показания к применению.** Профилактика и лечение гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

**Способ применения и дозы.** При остром заболевании детям в возрасте от 1 до 12 лет принимать по 1 таблетке каждые 2 ч (не более 8 таблеток в сутки) до

наступления улучшения. При дальнейшем лечении - принимать по 1 таблетке 3 раза в день.

Детям старше 12 лет и взрослым принимать при остром заболевании по 1 таблетке каждый час (не более 12 таблеток в сутки) до наступления улучшения, далее - по 1-2 таблетки 3 раза в день.

Длительность лечения: 7-10 дней (до полного исчезновения симптоматики).

*Для профилактики респираторно-вирусной инфекции* детям в возрасте от 1 до 12 лет рекомендуется принимать по 1 таблетке 3 раза в день. Детям старше 12 лет и взрослым принимать для профилактики по 1-2 таблетки 3 раза в день.

Длительность применения после контакта с людьми с острой респираторной инфекцией или гриппом - 1 неделя.

Таблетки принимают за полчаса до еды или через полчаса после еды, давая им медленно раствориться во рту. Детям в возрасте до 3 лет рекомендуется для удобства применения растворять таблетку в небольшом количестве воды (например, в чайной ложке).

**Побочное действие.** В редких случаях возможны реакции гиперчувствительности: высыпания на коже или желудочно-кишечные расстройства, такие как тошнота, рвота или диарея.

**Противопоказания.** Повышенная чувствительность к какому-либо ингредиенту препарата.

**Передозировка.** Вредные воздействия передозировки доныне не известны.

**Особенности применения.** При применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное первичное ухудшение симптомов заболевания. В этом случае следует снизить частоту и дозировку применения препарата и, после регрессии нежелательных симптомов, восстановить прием препарата согласно инструкции. В случае выраженного первичного ухудшения, сопровождающегося плохой переносимостью препарата, следует прекратить его применение.

Предостережение для больных с непереносимостью лактозы или глютеновой болезнью: Инфлюцид содержит лактозу и пшеничный крахмал.

При сохранении высокой температуры тела или при ее повышении свыше 39 °С, при сохранении или неясности симптоматики, а также при появлении новых симптомов следует изменить тактику лечения.

В соответствии с общепринятыми принципами применять препарат в период беременности и кормления грудью можно только после объективной оценки соотношения ожидаемого полезного эффекта и возможного риска.

**Взаимодействие с другими лекарственными препаратами.** Доныне не известны.

**Условия и срок хранения.** Хранить при комнатной температуре (15 - 25 °С) в недоступном для детей месте.

Срок годности - 5 лет.

Не применять после указанной на упаковке даты истечения срока годности.

**Условия отпуска.** Без рецепта.

**Упаковка.** По 20 таблеток в блистере; по 3 блистера в картонной коробке.

**Производитель.** Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ.

**Адрес.** Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруэ, Германия.

**Первый заместитель директора  
Государственного фармакологического  
центра МЗ Украины, д. мед. н., проф.**

**А. Н. Морозов**